


FIGURAS

Figura 127: Se observan radiolarios en luz polarizada plana con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 128: Se observa yeso y micrita en luz polarizada plana con objetivo 4X.






Figura 129: Se observa yeso y micrita en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 130: Se observan ooides de hematita con estructura concéntrica, en luz polarizada plana con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 131: Se observan ooides concentricos en luz polarizada plana con objetivo 4X.





Figura 132: Se observan ooides concentricos en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 133: Se observan ooides concéntricos en luz polarizada plana con objetivo 4X.





Figura 134: Se observan ooides concéntricos en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 135: Se observan intraclastos de hematita en luz polarizada plana con objetivo 4X.





Figura 136: Se observan intraclastos de hematita en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FÓSILES:

Figura 137: Restos de pez, luz polarizada plana con objetivo 10X.





Figura 138: Foraminíferos, nicols cruzados con objetivo 10X.



FIGURAS

Figura 139: Se observan restos de pez e intraclastos de colofana en luz polarizada plana con objetivo 4X.





Figura 140: Se observan restos de pez e intraclastos de colofana en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FÓSILES:

Figura 141: Foraminíferos piritizados, en luz polarizada plana con objetivo 10X.





Figura 142: Restos de pez, en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 143: Se observan intraclastos de colofana y restos de pez, en luz polarizada plana con objetivo 4X.






Figura 144: Se observan intraclastos de colofana y restos de pez, Nicols cruzados con objetivo 4X.



FÓSILES:

Figura 145: Foraminífero piritizado, en Nícoles cruzados con objetivo 10X.



Foraminífero
piritizado

Figura 146: Restos de pez, en luz polarizada plana con objetivo 4X.



Resto de pez

FIGURAS

Figura 147: Se observan intraclastos de colofana y restos de pez, en luz polarizada plana con objetivo 4X.





Figura 148: Se se observan intraclastos de colofana y restos de pez, en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FÓSILES:

Figura 149: Lamelibranquios en luz polarizada plana con objetivo 10X.




Figura 150: Algas con perforaciones en Nicols cruzados con objetivo 10X.





Figura 151: Foraminíferos en Nícoles cruzados con objetivo 10X.



FIGURAS

Figura 152: Bioesparudita arenosa (Vatan), se observan foraminiferos y Qm (cuarzo monocristalino) en luz polarizada plana con objetivo 4X.





Figura 153: Bioesparudita arenosa (Vatan), se observan foraminiferos y Qm (cuarzo monocristalino) Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 154: Se observan ooides concéntricos (pisoides) y material terrígeno, en nicoles paralelos con objetivo 4x.





Figura 155: Se observan ooides concéntricos (pisoides) y material terrígeno, en nicoles paralelos con objetivo 4x.



FÓSILES

Figura 156: Ostrácodo, en Nícoles cruzados con objetivo 4X.





Figura 157: Ostrácodo, en Nícoles cruzados con objetivo 4X.




FIGURAS

Figura 158: Se observan ostrácodos y material terrígeno en luz polarizada plana con objetivo 4X.




Figura 159: Se observan ostrácodos y material terrígeno en Nicols cruzados con objetivo 4X.



FÓSILES:

Figura 160: Restos de pez, en luz polarizada plana con objetivo 4X.



Resto de pez

FIGURAS

Figura 161: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), intraclastos de colofana y restos de pez en luz polarizada plana con objetivo 4X.






Figura 162: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), intraclastos de colofana y restos de pez en Nícoles cruzados con objetivo 4X.




FIGURAS

Figuara 163: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), Fp (feldespato plagioclase) y Lv (liticos volcanicos), en luz polarizada plana con objetivo 4X.



Figuara 164: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), Fp (feldespato plagioclase) y Lv (liticos volcanicos), en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 165: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), Fp (feldespato plagioclasa) y Lv (líticos volcánicos), en luz polarizada plana con objetivo 4X.





Figura 166: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), Fp (feldespato plagioclasa) y Lv (líticos volcánicos), en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 167: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), Fp (Feldespato Plagioclasa) y Lv (Lítico Volcánico), en luz polarizada plana con un objetivo 4X.





Figura 168: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), Fp (Feldespato Plagioclasa) y Lv (Lítico Volcánico), en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 169: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), Fp (feldespato plagioclasa) y Fk (feldespato potásico), en luz polarizada plana con objetivo 4X.





Figura 170: Se se observa Qm (cuarzo monocristalino), Fp (feldespato plagioclasa) y Fk (feldespato potásico), en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 171: Se observan Qm (cuarzo monocristalino), Fp (feldespato plagioclase) y Hb (horblenda), en luz polarizada plana con objetivo 4X.





Figura 172: Se observan Qm (cuarzo monocristalino), Fp (feldespato plagioclase) y Hb (horblenda), en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 173: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), Fp (feldespato plagioclasa) y Lv (Lítico volcánico), en luz polarizada plana con objetivo 4X.





Figura 174: Se observa Qm (cuarzo monocristalino), Fp (feldespato plagioclasa) y Lv (Lítico volcánico), en Nícoles cruzados con objetivo 4X.



FIGURAS

Figura 175: Se observa Qm (Cuarzo monocristalino), Lv (Lítico Volcánico) y Fp (Feldespato Plagioclasa) en luz polarizada plana con objetivo 4X.




Figura 176: Se observa Qm (Cuarzo monocristalino), Lv (Lítico Volcánico) y Fp (Feldespato Plagioclasa) en Nícoles Cruzados con objetivo 4X.

