

RÓTULO DE LÍQUIDOS

CAMA:

FECHA:

PACIENTE:

MEZCLA:

MEDICAMENTO:

DOSIS:

HORA INICIO:

HORA FINALIZACIÓN:

ORDENADO POR:

NOMBRE:

RÓTULO DE LÍQUIDOS

CAMA:

FECHA:

PACIENTE:

MEZCLA:

MEDICAMENTO:

DOSIS:

HORA INICIO:

HORA FINALIZACIÓN:

ORDENADO POR:

NOMBRE:

PROCOLO DE HEPARINA (GUSTO)

HEPARINA: 1 ampolla de 25.000 UI – 500 cc SSN.

- Paciente con un peso > de 70 kgs, administrar dosis bolo de 5.000 UI I.V, seguida de infusión a 1.000 UI/hora en 20cc.
- Paciente < de 70 kgs de peso, administrar 60 UI kg de peso y continua con 12 UI x KG de peso/hora.

TPT	DOSIS BOLO	PARAR INFUSION	CAMBIO DE VELOCIDAD	REPETIR TPT
< 36"	5.000 UI		+ 2 cc / hora	6 horas
36" – 49"			+ 1 cc / hora	6 horas
50" – 70"			No cambio	Mañana (24 horas)
71" – 80"			- 1 cc / hora	Mañana (24 horas)
81" – 100"		30 minutos	- 2 cc / hora	6 horas
101" – 130"		60 minutos	- 3 cc / hora	6 horas
> 130"		60 minutos	- 6 cc / hora	6 horas